

## INFORME ECOGRÁFICO ABDOMINAL

**Centro:** Clínica Veterinaria Petland

**Fecha:** 18/12/2025

### I. DATOS DEL PACIENTE

- **Nombre:** Anika
  - **Especie:** Canina
  - **Raza:** Criolla
  - **Sexo:** Hembra (no esterilizada)
  - **Edad:** 8 años
  - **Peso:** 10.9 kg
- 

### II. HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

#### 1. Hígado

- El parénquima hepático presenta **aumento difuso de la ecogenicidad** al compararlo con el bazo, el cual mantiene una ecogenicidad conservada.
- Hallazgo compatible con **hepatopatía difusa**.
- En el hígado, en **corte transversal**, se identifica una **lesión focal intrahepática**, de **bordes bien definidos**, ecogenicidad diferente al parénquima adyacente, compatible con **masa hepática**.
- La lesión fue medida en dos planos, con dimensiones aproximadas de:
  - **Diámetro mayor:** ~ 2.5 cm
  - **Diámetro menor:** ~ 1.7 cm
- La estructura no presenta características ecográficas de quiste simple.

#### 2. Bazo

- Parénquima esplénico de **ecogenicidad homogénea**, utilizado como referencia comparativa.
- Sin lesiones focales evidentes en las imágenes evaluadas.

### 3. Riñón izquierdo

- Se observa **líquido libre anecoico perirrenal**, localizado fuera de la cápsula renal.
- El parénquima renal visible no muestra alteraciones estructurales marcadas.

### 4. Riñón derecho

- Evaluado en **corte longitudinal**.
- Morfología renal conservada.
- Presencia de **líquido libre perirrenal**, de características anecoicas, similar a lo observado en el riñón izquierdo.

### 5. Vejiga urinaria

- Evaluada en **corte longitudinal**.
- Contenido predominantemente anecoico compatible con orina.
- Pared vesical sin engrosamientos marcados.
- Se identifica **líquido libre anecoico perivesical**, extraluminal.

### III. Hallazgos compatibles con:

1. **Hepatopatía difusa y esplenomegalia**, evidenciada por aumento de ecogenicidad hepática respecto al bazo.
2. **Masa hepática focal**, bien delimitada, de aproximadamente **2.5 × 1.7 cm**, de probable origen nodular.
3. **Presencia de líquido libre abdominal**, con distribución perirrenal bilateral y perivesical.

### IV. DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- Hiperplasia nodular hepática
- Adenoma hepático
- Nódulo regenerativo
- Neoplasia hepática primaria (a descartar)

### **líquido libre:**

- Efusión abdominal
- Proceso inflamatorio abdominal

### **V. RECOMENDACIONES**

- Correlacionar con **perfil bioquímico hepático y renal.**
- Considerar **abdominocentesis diagnóstica** y comparación de creatinina líquido/suero.
- Valorar **PAAF ecoguiada de la masa hepática.**
- Seguimiento ecográfico seriado según evolución clínica.

### **VI. CONCLUSIÓN**

**Ecografía abdominal con hallazgos compatibles con hepatopatía difusa, masa hepática focal bien delimitada y presencia de líquido libre abdominal,** lo que requiere correlación clínica y laboratorial para definir origen y conducta terapéutica.

**MV. HECTOR CASTILLO VELASQUEZ**

**CMVP 6302**







